

Péče o nové výsadby

Rostliny po výsadbě potřebují startovací záливku. Velmi důležité je brát v potaz roční období a momentální počasí. Rostliny potřebují mnohem více záливky po vysazení v letním suchém období, kdy je výpar ze země a z vlastní rostliny největší, než na podzim kdy převládá sychravé počasí.

Po výsadbě rostlin v sušším období zaléváme tak, aby půda v okolí rostlin úplně nevyschla alespoň po dobu jednoho měsíce až dvou měsíců, než rostliny zakoření. Taková záливka se realizuje dvakrát až pětkrát týdně dle počasí (3-8 l/m²). Při výsadbě stromů při průměru kmene přes 5 cm trvá zakořenění okolo půli roka, proto je důležité brát v potaz i velikost rostliny. Pozor však, aby rostliny nestály ve vodě. Pokud je výsadba zamulčována, potřeba záливky se automaticky snižuje (netkaná textilie a vrchní materiál zabraňují výparu z půdy). Obecně platí, že lepší je zalévat méně často, ale více vody najednou.

Paradoxně největší nebezpečí uschnutí rostliny je v zimě. Pokud trvají mrazy delší dobu, nemá rostlina ze zmrzlé země šanci vláhu dostat a zasychá. Proto pokud přijde obleva a srážky jsou pod normálem, je potřeba rostliny zalít, aby se před dalším zamrznutím země zásobili vodou. To platí především pro stálezelené rostliny, které v zimních měsících trpí nejvíce.

Odstraňují se uschlé a odkvetlé části rostlin. Také je důležitá kontrola vitality rostliny, zda není například nemocná či napadená nějakým škůdcem. Pokud se tak stane, je nutné se včas poradit s odborníky a zasáhnout. Pokud je invaze většího měřítka, můžeme do příchodu odborníka infikované a zasažené druhy rostlin odstranit či je umístit do karantény mimo dosah ostatních jedinců.